

COORDONNÉES UTILES



Service de neuropédiatrie 6e C
Hôpital des enfants Pellegrin - Bordeaux

Leur médecin :

Urgences médicales : 15


Urgences de l'hôpital des enfants : 05 56 79 59 72

Service neurologie 6° C : 05 56 79 56 26

M

QUE FAIRE EN CAS DE CRISE CONVULSIVE ?

Position latérale de sécurité :



ASSURER LA SÉCURITÉ DE L'ENFANT

Pour éviter qu'il inhale s'il vomit ou salive beaucoup :
L'installer sur le côté dès que possible (position latérale de sécurité).

Pour éviter qu'il ne se blesse :

- ⇒ Écarté les objets autour de lui.
- ⇒ Mettre une protection sous sa tête selon la nature du sol.

Pour éviter de le blesser :

- ⇒ Ne pas essayer d'ouvrir la bouche de force car risque de lui casser les dents, s'il était en train de manger, lui ôter les aliments de la bouche.
- ⇒ Ne rien mettre dans la bouche (ne pas faire boire, pas de cuillère, de mouchoirs).

Pour lui permettre de bien reprendre son souffle, de bien s'oxygéner :

- ⇒ Défaire tous les vêtements qui pourraient gêner une bonne respiration.
- ⇒ Veiller à ce que la pièce soit bien aérée.

En fin de crise, le laisser se reposer lorsqu'il reprend conscience, le rassurer, lui redonner des repères (lui dire ce qu'il s'est passé, où il est...).

Essayer d'observer

Comment débute la crise
Comment elle évolue
Combien de temps elle dure
Comment l'enfant récupère

En cas de crise de plus de 5 minutes

Faire du Valium en intra-rectal :

- Prélever la quantité prescrite



- Prendre de l'air dans une seringue (l'air sera derrière le Valium pour vider la canule)



- Injecter le produit en introduisant la canule dans l'anus de l'enfant
- Ensuite bien serrer les fesses de l'enfant pendant environ 1 minute
Si la crise persiste 5 minutes après l'injection, refaire la même dose